

芝 生 づ く り

種類

日本芝…ノシバ, コウライシバ, ビロードシバの3種があり, 夏にはふく茎を伸ばして広がり, 冬には葉が枯れます。コウライシバが最も多く市販されており, 一般家庭での利用に適しています。株分けで殖やします。

西洋芝…ベントグラス類, ブルーグラス類, フェスキュー類, ライグラス類, バミューダグラス類の5種類があります。大部分が常緑で, 冬に株が増大し, ほふく茎は発達しません。冷涼地に適するものが多く, 種子を播いて殖やします。我が国では, ゴルフ場や運動場など特殊な用途に利用されています。

年間管理

表 日本芝の管理

| 作業 | 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 備 考 |
|-------|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--|
| 植え付け | | | | 最適期 | | | | | | | | | | |
| 芝刈り | | | | | | | | | | | | | | 1~2回/月 3~4cmに刈る |
| 施肥 | | | | | | | | | | | | | | 油カス 50g/m ² 化成肥料 20~40g/m ² |
| 目土入れ | | | | | | | | | | | | | | 1~2回/年 約5mmの厚さ |
| 除草 | | | | | | | | | | | | | | 除草剤 抜き取り シマジン, 2・4-Dなど |
| 病虫害防除 | | | | | | | | | | | | | | ウスチャコガネ さび病 ブラウンパッチ |
| 穴あけ☆ | | | | | | | | | | | | | | ホーク等で, 深さ5cm以上の穴を10cm間隔であける |
| 縁切り | | | | | | | | | | | | | | 不要な部分の芝を切り除く |

☆つまりすぎた株をはぐし, 通風を良くするため2~3年に1回おこなう

芝の張り方

- ①肥料, 土壌改良剤をよく混ぜて平らに整地する
- ②芝苗を3~4cmずつ間隔をあけて並べる
- ③上から板などで押えて土と密着させる
- ④葉先がのぞく程度までふるった土をかけて, たっぷり水をやる




図 芝の張り方

おもな病虫害

さび病…春と秋に発生し, 橙黄色の病斑ができます。有機硫黄剤などで防除します。
 ブラウンパッチ…夏の高温多湿期に発生し, リング状に枯れます。通風を良くし, チッ素肥料をひかえます。ダイホルタン, キャプタン剤, オートサイド剤などで防ぎます。
 ウスチャコガネ…4~5月の成虫発生期にスミチオン, ディフテレックスを散布します。