

アザレアの育て方

アザレアは、いわゆるツツジと比べて耐寒性が弱く、冬の管理に注意が必要です。

年間管理

| | 1月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------|------------|---|-----------|---|---------|---|---|---------|------------|-----|----|----|
| 生 育 | 開花 | | 新芽伸長・葉の展開 | | | | | | | 開花 | | |
| 置き場所 | 霜除け | | | | 屋外 | | | | | 霜除け | | |
| 日当たり | できるだけ明るく | | | | 30%遮光 | | | | できるだけ明るく | | | |
| 水 や り | 用土の表面が乾いたら | | | | 毎日 | | | | 用土の表面が乾いたら | | | |
| 肥 料 | | | | | 油かす | | | 液肥を月に2回 | | | | |
| 作 業 | ← 剪定 → | | | | ← 挿し木 → | | | | ← 植え替え → | | | |

開花時（冬）の管理

置き場所 霜に当たらないよう、室内や軒下に入れます。

花がら取り 咲き終わった花は、放置すると病気の原因になるので、その都度取り除きます。

植え替え

毎年または2年に1回の割合で行います。

適 期 3～5月上旬（花後）。
温室があれば2月から可能。

鉢 1回り大きな鉢。

（ただし6号鉢以上では、同じ大きさがのぞましい）

用 土 鹿沼土7：腐葉土3の混合土。

剪 定


アザレアは5～6月に花芽を分化するので、花後から5月上旬の間に剪定します。

挿し木


4～6月に行います。挿し床には鹿沼土を使います。

病害虫の防除

夏にハダニがよく発生します。朝夕の葉水は防除に効果がありますが、発生がひどいときは殺ダニ剤を散布します。



植え替えのしかた



剪定のしかた

